

ویژگی های مواد محرک و علایم سوء مصرف آنها

Stimulants

- Cocaine
 - Amphetamines
 - Amphetamine
 - Ephedrine
 - Metamphetamine
 - Methylphenidate
 - Pemoline
 - Cathinone (*khat*)
 - Ecstasy
-

۲ محرک مشکل ساز در ایران

- Cocaine
- Amphetamines
 - ❑ Amphetamine
 - ❑ Ephedrine
 - ❑ **Methamphetamine**
 - ❑ Methylphenidate
 - ❑ Pemoline
 - ❑ Cathinone (*khat*)
- **Ecstasy**

Methamphetamine








Methods of use



Scott Houston / Corbis Sygma

اثرات مصرف

اثرات تا حدی بسته به شیوه مصرف است



اثرات روانی محرک ها در فاز سرخوشی

- Increased alertness
- Feeling of well-being
- Euphoria
- Increased self-esteem
- Feeling of competence
- Decreased need for sleep/wakefulness
- Increased libido
- Increased concentration and memory
- Disinhibition
- Increased curiosity
- افزایش هوشیاری و انرژی
- احساس سلامت و سرحالی
- نشئگی و سرخوشی
- افزایش اعتماد بنفس
- احساس کفایت و توانمندی
- کاهش نیاز به خواب / ↑↑ بیداری
- افزایش میل جنسی
- افزایش تمرکز و یادگیری
- کاهش مهارها
- افزایش کنجکاوی
- زمان: تقریبا ۱۰ تا ۲۰ ساعت این فاز طول می کشد.

Rush

- لذتی شدید و ناگهانی
- احساس خاص خلسه مانند
- ثبت و بخاطر آوردن دقیق جزئیات در زمان آن
- شرطی شدن بسیار شدید با محیط مربوطه
- شیشه باعث آزاد سازی تمامی و ناگهانی کاته کولامین ها می شود. اپی نفرین. نورایی نفرین (motor). دوپامین. (نشئگی) یک ابر دوپامین آزاد کن است.
- چربی سوز هستند.
- آدمی که در مسابقه بوکس است

اثرات جسمانی حاد در جریان مصرف

- افزایش ضربان قلب
- طپش قلب
- بالا رفتن فشار خون
- کاهش اشتها
- گشادی مردمکها
- عرق ریزش
- خشکی دهان
- لرزش اندام ها
- افزایش دمای بدن
- امکان عوارض حاد ناشی از موارد فوق: سکته، خونریزی،...

Dilated pupil - stimulant intoxication



اثرات جسمانی مواد محرک با ادامه مصرف

- بالا رفتن فشار خون
- آسیب های قلبی عروقی
- کاهش وزن
- تحلیل رفتن بافت ها (بخشی به دلیل تغذیه نامناسب)
- زخم دهان و خرابی لثه ها و دندان ها (دندان ها را زود خراب می کند)
- زخم بدن (بخشی به دلیل کاهش بهداشت و بخشی به دلیل کندن)
- زخم ها التیام می یابند اما باز می مانند.



1998



2002



Dental problems caused by Meth



Meth needle marks



Abscesses caused by “cranking” (injecting Meth intravenously)





2005© "Faces of Meth"

2.5 Years Later



اثرات روانی محرک ها با ادامه مصرف

۱ تا ۳ ماه بعد از مصرف حالت های زیر ایجاد می شود

- تحمل به اثرات
- احساس اجبار شدید به مصرف
- وسوسه (کرم داره دکتر)
- افسردگی (ته خط)
- رفتارهای اجبارگونه و تکرارشونده (کلید می کنند)
- افت کارکرد و انرژی
- کاهش تمرکز و حافظه
- رفتارهای تکانه ای و ناگهانی
- پرخاشگری و بیقراری
- نوسانات عاطفی و خلقی
- بدبینی (خبر های است)
- توهم و هذیان
- گوشه گیری و انزواطلبی